

★★★ 予防接種のお知らせ ★★★

お子さんの予防接種は順調にお済みでしょうか？ 追加接種等、期間が開いて未接種のものがないか母子手帳を確認してみてください。もし接種していないものがございましたら、対象年齢の内に接種するようにお願いします。

予防接種の種類			標準接種期間	接種可能期間
BCG			生後 5～8 か月未満	1 歳未満
四種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)	1 期初回	1 回目	生後 3 か月～1 歳未満	生後 3 か月～ 90 か月(7 歳半) 未満
		2 回目	1 回目終了後 3～8 週の間	
		3 回目	2 回目終了後 3～8 週の間	
	1 期追加		1 期初回終了後 12～18 か月の間	
二種混合(四種混合 2 期) (ジフテリア、破傷風)			11 歳～12 歳未満	11 歳以上 13 歳未満
麻しん風しん 混合(MR)	1 期		1 歳～2 歳未満	1 歳～2 歳未満
	2 期		小学校就学前の 1 年間	小学校就学前の 1 年間
日本脳炎 (※)	1 期初回	1 回目	3 歳～4 歳未満	生後 6 か月～ 90 か月(7 歳半) 未満
		2 回目	1 回目終了後 1～4 週の間	
	1 期追加		4 歳～5 歳未満 (1 期初回終了後おおむね 1 年おく)	
	2 期		9 歳～10 歳未満	
ヒブ	1 期初回	1 回目	生後 2 か月～7 か月未満	生後 2 か月～5 歳未満
		2 回目	1 回目終了後 4～8 週の間	
		3 回目	2 回目終了後 4～8 週の間	
	1 期追加		1 期初回終了後 7～13 か月の間	
小児肺炎球菌	1 期初回	1 回目	生後 2 か月～7 か月未満	生後 2 か月～5 歳未満
		2 回目	1 回目終了後 28 日以降	
		3 回目	2 回目終了後 28 日以降 ※1 歳未満までに完了すること	
	1 期追加		1 期初回終了後 61 日以降 (生後 12 か月～15 か月の間)	
子宮頸がん	2 価 ワクチン	1 回目	中学 1 年生	小 6～高 1 ※ 子宮頸がんのワクチンは 2 種類のうち、どちらかを 3 回接種します。
		2 回目	1 回目終了後 1 か月後	
		3 回目	1 回目終了後 6 か月後	
	4 価 ワクチン	1 回目	中学 1 年生	
		2 回目	1 回目終了後 2 か月後	
		3 回目	1 回目終了後 6 か月後	